

# **Ουροθηλιακός Καρκίνος**

**Σ.Στεφανάκης**

**Δ/ντης Ουρολογικής Κλινικής Γ.Π.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»**

- Ουροθηλιακός Καρκίνος (Ο.Κ.) είναι ο 5<sup>ος</sup> πιο συχνός καρκίνος
- Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως αποτελεί το 90%-95% Ο.Κ.
- Οι όγκοι του πυελοκαλυκτικού είναι διπλάσιοι σε σχέση με του ουρητήρα
- 60% των όγκων του ανώτερου ουροποιητικού είναι μυοδιθητικοί έναντι του 25% της ουροδόχου κύστεως
- Παγκοσμίως ο καρκίνος ουροδόχου κύστεως είναι 7η συχνότερη κακοήθεια μεταξύ ανδρών και 17η μεταξύ γυναικών
- 430.000 νέες περιπτώσεις διεγνώσθησαν το 2012 και απεβίωσαν 165.000
- Στην Ευρώπη και ΗΠΑ στο σύνολο των κακοήθων όγκων μεταξύ ανδρών αναλογεί στο 5-10%
- Είναι 3- 4 φορές πιο συχνός στους άνδρες απ' ότι στις γυναίκες

- Παγκοσμίως η θνησιμότητα είναι 2-10 ανά 100.000 άνδρες και 0,5 - 4 ανά 100.000 γυναίκες
- Οι άνδρες έχουν υψηλότερα ποσοστά 5ετούς επιβίωσης απ' ότι οι γυναίκες
- Εμφανίζεται σε οποιαδήποτε ηλικία
- Είναι γενικώς νόσος της μέσης και προχωρημένης ηλικίας (μέση ηλικία 69 για άνδρες και 71 για γυναίκες)
- Από πλευράς επιπολασμού στους άνδρες μέσης και προχωρημένης ηλικίας είναι η δεύτερη πιο συχνή κακοήθεια
- Το 2010 το οικονομικό κόστος στις ΗΠΑ ανήλθε στα 150 δις δολάρια και εκτιμάται στα 150 δις το 2020
- \$ 150000 το μέσο κόστος για κάθε πρωτοεμφανιζόμενο μυοδιηθητικό καρκίνο